

臺中健康暨管理學院九十學年度碩士班招生考試試題紙

所 別	組 別	考試科目	考試日期	節 次	備 註
健康管理研究所	乙	臨床醫學概論	5月5日	第二節	單選題：每題二分
<p>1. 下列何者不是小血球型貧血(microcytic anemia)? (A)缺鐵性貧血(iron deficiency anemia) (B)海洋性貧血(Thalassemia) (C)Sideroblastic anemia (D)再生不良性貧血(Aplastic anemia)</p> <p>2. 下列何者為慢性骨髓性白血病(chronic myelogenous leukemia)的染色體變化? (A)t(8:12) (B)t(9:22) (C)t(8:14) (D)t(15:17)</p> <p>3. 石棉工作者最常發生之癌症為： (A)肺癌 (Bronchogenic carcinoma) (B)間皮癌 (Malignant mesothelioma) (C)胃癌 (D)肝癌</p> <p>✓4. 在因職業場所之暴露所造成的心臟血管疾病之中，以下何者之暴露是在休息的日子反而較易造成心絞痛(Angina)? (A)一氧化碳 (B)二硫化碳 (C)二氧化氮 (D)硝化甘油</p> <p>5. 暴露於染料所使用之化學品，如聯苯胺(Benzidine)類可引起以下何種病變? (A)間皮癌 (Malignant mesothelioma) (B)膀胱癌 (C)肺癌 (D)肝癌</p> <p>6. 以下敘述何者正確? (A)矽肺症可以治癒 (B)石棉肺病的主要肺功能變化為阻塞性呼吸障礙 (C)石棉與吸菸之致癌性有協力作用 (synergistic effect) (D)職業性氣喘症絕大多數為立即發作型 (immediate type)氣喘症</p> <p>✓7. 關於糖尿病肌萎縮(Diabetic amyotrophy)，下述何者錯誤? (A)經常犯前臂 (B)常併體重減輕 (C)常併疼痛 (D)常併厭食(Anorexia)與抑鬱(depression)</p> <p>8. 某病人的血清病毒標誌呈現 HbsAg, Anti-HBs 均為陰性，Anti-HbcIgM 陽性，而 HbeAg, Anti-Hbe 均為弱陽性，則其最恰當的診斷為： (A)急性乙型肝炎，Anti-HBc 空窗期 (B)慢性乙型肝炎 (C)急性乙型肝炎前期，高傳染力 (D)急性丙型肝炎</p> <p>9. 下列何者不是膽固醇結石的前驅因子? (A)肥胖 (B)高熱量飲食 (C)酒精性肝硬化 (D)長期靜脈營養</p> <p>10. 根據美國風濕學院 1982 年對全身性紅斑狼瘡訂定的 11 項診斷標準，下列那一項並不包括在內? (A)蝴蝶斑疹 (malar rash) (B)口腔潰瘍 (oral ulcers) (C)雷諾氏現象 (Raynaud's phenomenon) (D)陽光敏感 (photosensitivity)</p> <p>11. 下列有關主動脈瓣狹窄須考慮開刀的時機，何者錯誤? (A)左心室肥厚 (B)心衰竭症狀 (C)心絞痛 (D)昏厥</p> <p>✓12. 下列何者較不易併發感染性心內膜炎? (A)心室中隔缺損(VSD) (B)心房中隔缺損(ASD) (C)開放性肺動脈導管(PDA) (D)二尖瓣閉鎖不全</p> <p>13. 毛地黃中毒的易致因子，下列何者錯誤? (A)腎衰竭 (B)血鉀過低 (C)血鈣過低 (D)血氧過低</p> <p>14. 下列何種血尿(hematuria)的情況，應屬於非腎絲球性出血(extraglomerular bleeding)? (A)異型的紅血球(Dysmorphic RBC) (B)紅血球圓柱體(RBC casts) (C)伴有重度蛋白尿(Heavy proteinuria) (D)血塊(Blood clots)</p> <p>15. 急性氣喘發作時，首先考慮使用之藥物為： (A)乙二型交感神經刺激劑 (B)茶鹼 (C)類固醇 (D)抗脂鹼藥物</p>					

臺中健康暨管理學院九十學年度碩士班招生考試試題紙

所 別	組 別	考試科目	考試日期	節 次	備 註
健康管理研究所	乙	臨床醫學概論	5月5日	第二節	

16. 下列有關世界衛生組織(WHO)定義的出血性登革熱，何者錯誤？
 (A)急性發生的高燒，持續至少兩週 (B)出血現象，包括血壓帶試驗陽性反應
 (C)血液濃縮現象 (D)血小板低下
17. 下列何者不是失智症(dementia)的原因？
 (A)慢性硬腦膜下出血(chronic subdural hematoma)
 (B)隱球菌性腦膜炎(cryptococcal meningitis)
 (C)甲狀腺機能不足(hypothyroidism)
 (D)Guillain-Barre 症候群
- ✓ 18. 流行性感感冒疫苗是一種非活性疫苗，台灣地區的 65 歲以上老年人自民國八十七年十月開始接種，該疫苗含有下列那兩型的流行性感感冒病毒的成份？
 (A)A 型及 B 型 (B)B 型及 C 型 (C)C 型及 D 型 (D)A 型及 D 型
19. 下列造成民眾過早死亡(premature death)的因素中，何者最為重要？
 (A)醫療照顧體系的不方便 (B)不良的生活型態
 (C)環境因素(污染、職業、毒性物質)的影響 (D)基因、遺傳的因素
20. 若胸前從未開過刀或受傷，但有突起螃蟹爪狀之增生性疤痕，其適當之治療法為：
 (A)手術切除 (B)局部病灶內注射 triamcinolone (steroid) (C)放射線局部照射
 (D)局部塗抹去疤軟膏
21. 下列那種情況是體外震波碎石術的絕對禁忌？
 (A)過度肥胖 (B)心律不整 (C)懷孕 (D)鹿角石(staghorn stone)
22. 攝護腺肥大著效的藥物可使病人排尿即時改善，因為膀胱頸的攝護腺尿道可持續放鬆，請問這類藥物藥理機轉是：
 (A) α receptor Blockade (B) β receptor Blockade
 (C) Anticholinergic (D) Muscle Relaxant
23. 一個十歲男童突然一個陰囊腫痛，藥物無法緩解，尿液檢查無異狀，最可能的診斷是：
 (A)睪丸腫瘤(Testicular Tumor) (B)副睪丸發炎(Epididymitis)
 (C)睪丸扭轉(Testicular Torsion) (D)陰囊積水(Hydrocele)
24. 唸珠膀胱尿道攝影(Chain Cystourethrogram)是將一唸珠置入女性尿道，並灌入膀胱顯影劑以此診斷女性那種排尿問題？
 (A)女性過動膀胱(Overactive Bladder) (B)女性應力尿失禁(Stress Incontinence)
 (C)女性子宮脫垂(Uterine Prolapse) (D)女性膀胱閉鎖(Bladder Neck Stenosis)
25. 先天性總膽管囊腫(choledochal cyst)在下列的重點中有一項是錯誤的，請選出：
 (A)女性，過度性黃疸、腹痛 (B)超音波是診斷的最佳方法
 (C)手術時必需保留一部分囊腫以利與小腸做吻合
 (D)手術時，囊腫必需全部切除做肝門部腸吻合較佳
- ✓ 26. 先天性食道閉鎖症有很多型態，最常見的是：
 (A)近端及遠端食道皆呈閉鎖，無氣管瘻 (B)近端食道閉鎖，遠端食道與氣管相通
 (C)近端食道與氣管相通，遠端食道呈閉鎖 (D)近端食道與氣管上部相通，遠端食道與氣管下部相通
27. 新生兒的輸液不同於成人的最大生理上的差別是新生兒的全身體水份量佔了體重的約：
 (A)50% (B)60% (C)70% (D)80%
28. 下列下肢靜脈曲張病人，那一位不可做下肢靜脈剝除術治療？
 (A)深部靜脈栓塞 (B)表層靜脈血栓炎 (C)靜脈破裂出血 (D)靜脈曲張很大

臺中健康暨管理學院九十學年度碩士班招生考試試題紙

所 別	組 別	考試科目	考試日期	節 次	備 註
健康管理研究所	乙	臨床醫學概論	5月5日	第二節	

29. 急性心肌梗塞併發心室中隔破裂，使用主動脈內氣球幫浦後，最好在什麼時候做開心手術？ (A) 緊急手術 (B) 三天無效才手術 (C) 一星期後手術 (D) 二星期後手術
30. 下列有關早期胃癌之敘述，何者正確？
 (A) 必須是癌腫小於 10mm (B) 不會有淋巴節侵犯
 (C) 侷限於黏膜及黏膜下層(submucosa) (D) 五年存活率約 75%
31. 對於頭部外傷治療，目前的研究報告為類固醇角色何者最正確？
 (A) 可降低顱內壓 (B) 可減少腦水腫 (C) 有神經保護的作用 (D) 無法證明有效
32. 下列有關細菌性肝膿瘍的描述，何者正確？
 (A) 一般以抗生素治療即可 (B) 所有病人皆需手術引流 (C) 除了針對肝膿瘍治療外，也要針對可能的潛在感染源治療 (D) 經皮穿刺引流對多發性膿瘍比單一性膿瘍有用
33. 有關乳房纖維囊腫的敘述，何者最正確？
 (A) 通常在停經後會消失 (B) 併發乳癌的機率較高 (C) 一定需要切片檢查
 (D) 經常會有乳房疼痛
34. 作 jumar puncture, 在 infant 的最佳位置是：(A) L3-4 (B) L4-5 (C) L5-S1 (D) L2-L3
35. 手腕骨(carpal bone)中最常見骨折者為：(A) 半月狀骨(lunate) (B) 舟狀骨(scaphoid)
 (C) 豆狀骨(pisiform) (D) 頭狀骨(capitate)
36. 下列有關軟骨發育不全(achondroplasia)之敘述，何者錯誤？
 (A) 是短肢侏儒(short-limbed dwarfism)中最常見的疾患 (B) 常於出生時便可診斷
 (C) 好發育椎管狹窄症(spinal stenosis) (D) 最常見的下肢病變是膝外翻(genu valgum)
37. 下列何種情形比較不會誘發痛風的發作？(A) 服用利尿劑 (B) 接受化學治療
 (C) 服用非類固醇消炎劑 (D) 接受手術
38. 下列何靜脈用來放置中央靜脈導管，所產氣胸之機率最高？(A) 內頸靜脈
 (B) 鎖骨下靜脈 (C) 股靜脈 (D) 外頸靜脈
39. 下列何種疾病可使用 Ketemine 麻醉？(A) 冠狀動脈疾病 (B) 開性眼受傷
 (C) 急性出血性休克 (D) 動脈瘤
40. 世界衛生組織對於早產(preterm birth)之定義為：(A) 妊娠期低於 37 週
 (B) 妊娠期低於 35 週 (C) 妊娠期低於 33 週 (D) 新生兒體重小於 2500 公克
41. 下列何者不是胎兒生長遲滯的危險因子？(A) 子宮內感染 (B) 母親年紀過大
 (C) 先天性畸型 (D) 多胞胎妊娠
42. 關於活的減毒疫苗敘述，何者錯誤？
 (A) 通常只需接種一次，就可以維持較久的免疫力 (B) 需加入佐劑才能增強
 免疫反應 (C) 可以與不活性疫苗同時接種 (D) 可以與其他活性疫苗同時接種
43. 一歲男孩，因高燒五天不退來診，查詢病史得知發燒剛開始幾天，有皮疹、
 結膜充血、卡介苗癤痕紅腫現象，體檢呈口腔黏膜充血、草莓般舌、肢端腫脹、
 頸部淋巴結腫大，最可能的診斷為：(A) 川崎氏病(Kawasaki's disease)
 (B) 猩紅熱(Scarlet fever) (C) 嬰兒玫瑰疹(Roseola Infantum)
 (D) 感染性單核球增多症(Infections Mononucleosis)
44. 有關腸病毒(Enterovirus)感染之敘述，下列何者錯誤？
 (A) 感染途徑主要是鼻一口途徑 (B) 主要引起流行性 pleurodyia (Bornholm disease)
 之病毒是 coxsackie virsres B3 及 B5 (C) enterovirus71 型可引起手足口症，亦可
 併發無菌性腦膜炎、腦炎、麻痺甚至死亡 (D) 嚴重中樞神經腸病獨感染者使用
 Acyclovir 合併免疫球蛋白，可減低死亡率與後遺症

臺中健康暨管理學院九十學年度碩士班招生考試試題紙

所 別	組 別	考試科目	考試日期	節 次	備 註
健康管理研究所	乙	臨床醫學概論	5月5日	第二節	

- √45. 出生後至3個月大時之正常嬰兒每天所需要的熱量約為多少？(A)60 Kcal/kg/day
(B)80 Kcal/kg/day (C)115 Kcal/kg/day (D)150 Kcal/kg/day
46. 母親若為性連鎖顯性遺傳之患者，則其每一子女發生同樣疾病之機會為：
(A)0% (B)25% (C)50% (D)100%
47. 在CT檢查中發現兩側腎臟均有境界分明，內含脂肪的腫瘤時，應考慮那一種常伴隨之疾病？(A)Neurofibromatosis (B)Tuberous Sclerosis (C)Multiple Sclerosis
(D)Polycystic Kidney Disease
48. 下列何者在電腦斷層攝影(computed tomography, CT), CT最高？
(A)血液 (B)腦灰質 (C)腦白質 (D)鈣化處
49. 腦中風導致構音肌肉無力造成的語言障礙，稱為：
(A)失語症(aphasia) (B)語言失用症(apraxia) (C)口語不清(dysarthria)
(D)失聲症(dysphonia)
50. 下列何者是治療攝食障礙(eating disorders)的首要選擇藥物？
(A)抗精神病藥 (B)抗憂鬱藥 (C)情緒穩定藥 (D)抗焦慮藥