

亞洲大學

108 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	108.03.16	10:30-11:30

單選題：共 25 題，每題 4 分

- 依據 Kring 等人 (2015)，有關青少年的藥物濫用問題之敘述，下列何者錯誤？
 - 不同的青少年均會循著相同的發展軌跡 (trajectories) 產生上癮行為。
 - 青少年酒精濫用行為起始點大多在過早接觸喝酒，且在高中時期增加飲酒量。
 - 有酒精濫用問題的青少年早期喝酒量少，不過在高中時開始增加飲酒的數量。
 - 有酒精濫用行為的女生，在青少年時期出現兩個增加飲酒數量的高峰。
- 有關酒精可能引發的障礙，下列何者正確？
① 中毒譫妄； ② 戒斷譫妄； ③ 失智； ④ 失憶； ⑤ 精神病症狀；
⑥ 情感障礙症； ⑦ 焦慮障礙症； ⑧ 性功能障礙； ⑨ 睡眠障礙
 - 僅①②③⑤⑦。
 - 僅②④⑥⑧⑨。
 - 僅①⑤⑥⑦⑧⑨。
 - ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨。
- 下列有關安非他命 (amphetamines) 的敘述何者錯誤？
 - 在我國「毒品危害防制條例」的規範中，是屬於第二級毒品。
 - 在 DSM-5 中將其成癮特性歸類興奮劑 (stimulants) 的一種。
 - 會導致釋放正腎上腺素 (norepinephrine)。
 - 若大量吸食會讓人感覺昏昏欲睡、提不起勁做事。
- 下列何者不是暴食症之常見共病？
 - 焦慮症。
 - 憂鬱症。
 - 身體型疾患。
 - 物質濫用。
- 對厭食症 (anorexia nervosa) 的心理治療通常可劃分為兩階段的目標，對此二階段的說明，下列何者正確？
 - 第一階段：讓個案增重；第二階段：長期維持所增加的體重。
 - 第一階段：增加自我滿意度；第二階段：養成好的飲食習慣。
 - 第一階段：增加自我滿意度；第二階段：增加社會情緒穩定程度。
 - 第一階段：增加社會情緒穩定程度；第二階段：養成良好的社會技能。
- 有關夢遊的敘述，下列何者錯誤？
 - 睡眠剝奪可能提高出現的可能性。
 - 生活壓力可能提高出現的可能性。
 - 在後半夜出現的可能性較高。
 - 睡眠呼吸中止症可能干擾睡眠而提高夢遊出現的機會。

亞洲大學

108 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	108.03.16	10:30-11:30

7. 下列何者是猝睡症與嗜睡症都會有的症狀？

- 日間無法維持清醒而陷入睡眠狀態。
- 突然喪失肌肉張力。
- 睡眠癱瘓。
- 臨睡幻覺。

8. DSM-5 之診斷中，下列何者不是神經發展障礙症（neurodevelopmental disorders）？

- 智能發展障礙症（intellectual developmental disorder）。
- 社交溝通障礙症（social communication disorder）。
- 遺尿症（enuresis）。
- 妥瑞氏症（Tourette's disorder）。

9. ODD 與 CD 都被認為具有神經心理功能的缺損，根據 Rubia（2010）的分類，ODD 與 CD 特別被認為與那一種神經心理功能缺損有關？

- 注意力。
- 工作記憶。
- 行為抑制。
- 酬賞與動機。

10. 有研究顯示出生時低體重是未來發展出 ADHD 的預測因子之一，但是透過下列何者，孩子出生時低體重的負向效果可以大大被降低？

- 兒童於五歲前服用高單位的維他命加上葉酸。
- 母親以溫暖方式養育孩子。
- 孩子五歲前給予高蛋白的飲食。
- 餵食母乳達至少兩個月。

11. 下列何者是網路遊戲成癮時易出現的戒斷反應？

- 不能玩網路遊戲時，興奮、手抖、幻聽。
- 過度玩網路遊戲時，坐立不安、煩躁、緊張或沮喪。
- 不能玩網路遊戲時，坐立不安、煩躁、緊張或沮喪。
- 過度玩網路遊戲時，興奮、開心、自信。

12. 下列何者不是 ICD-11 定義的網路遊戲成癮診斷標準？

- 只顧玩遊戲而不顧其他興趣、生活中活動。
- 過度玩網路遊戲造成常常坐立不安、發脾氣、心情不穩或緊張沮喪
- 因為玩網路遊戲，影響個人、家庭、社會、職業功能。
- 明知道玩網路遊戲已經帶來許多壞處，但還是無法減少。

13. 有關自殺的觀念，下列何者錯誤？

- 常說自殺的人常不會自殺。
- 自殺者自殺前常出現警訊言語或行為。
- 自殺前常很矛盾，既想要死，也想活。
- 問一個憂鬱或情緒困擾的人有沒有想到死或自殺，不會引起他（她）去自殺；唯有問了，才能給機會讓他（她）紓解。

亞洲大學

108 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	108.03.16	10:30-11:30

14.病人常因孤立，遠離社會而增強憂慮自己的問題是獨特唯一的；在團體中聽到其他成員袒露與自己相似的憂慮時，有種共鳴舒解的感覺，這是何種療效因子？

- 灌輸希望。
- 普同感。
- 存在因素。
- 宣洩。

15.對個案的負面自動化想法的認知改變技巧為：

- 同理。
- 面質。
- 解釋。
- 蘇格拉底詢問。

16.從認知治療的取向來看，Social Anxiety 的形成與下列何者因素有關？

①注意他人對自己的負面評價 ②特別在意自己給他人的形象
③缺乏適當社交技巧 ④告訴自己「別人一定不會喜歡我」

- 僅①②③。
- 僅①②④。
- 僅①③④。
- ①②③④。

17.有關適應性症候群（General Adaptation Syndrome，GAS）之敘述，以下何者正確？

- 由 Holmes & Rahe 所提出。
- 壓力下反應依序出現的，包括：警覺期（alarm reaction）、衰竭期（exhaustion）、抗拒期（resistance）症候群。
- 以腎上腺皮質而言，在警覺期是擴大。
- 以腎上腺皮質而言，在衰竭期是萎縮。

18.有關偏差行為（abnormal behavior）定義的 4D，以下何者為非？

- Deviation。
- Distress。
- Dysfunction。
- Devotion。

19.有關思覺失調症（schizophrenia）患者之正性症狀（positive symptoms），以下何者為非？

- 妄想（delusions）為患者常見之正性症狀之一。
- 幻覺（hallucinations）為患者常見之正性症狀之一。
- 貧語症（alogia）為患者常見之正性症狀之一。
- 患者正性症狀中可能包含知覺異常。

亞洲大學

108 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	108.03.16	10:30-11:30

20. 有關思覺失調症，以下何者為非？

- 患者常社經地位較低。
- 移民至較先進國家的人較未移民的人有較高風險罹患思覺失調症，此發現支持社會引發假說 (sociogenic hypothesis)
- 患者的父親並非處於社經地位弱勢，此發現支持社會選擇假說 (social-selection hypothesis)
- 家庭成員間高情緒表達 (expressed emotion) 常能預測患者長期症狀穩定趨緩。

21. 有關失智症 (dementia)，以下何者為非？

- 阿茲海默病 (Alzheimer's disease) 為最主要之病因。
- 老年人常罹患失智症。
- 部份失智症能夠治療。
- 額顳葉退化 (frontotemporal lobar degeneration) 為失智症之一種病因。

22. 關於譫妄 (delirium)，以下何者為非？

- 電解質失調有可能導致譫妄。
- 患者可能無法與人溝通。
- 相對老年人，譫妄較容易發生於年輕人。
- 患者有可能自譫妄中完全恢復。

23. 有關憂鬱 (depression) 相關理論，以下何者為非？

- 認知理論認為憂鬱個體常建立負向基模 (schema)。
- 無助/無望感 (helplessness/hopelessness) 理論認為個體因對於負向經驗無法控制與改變而憂鬱。
- 人際理論個體因停滯 (fixate) 於某性發展階段而無法正常進行人際交流而憂鬱。
- 芻思 (rumination) 理論認為患者常過份聚焦於負向經驗、並針對負向經驗反覆思考。

24. 有關情感性疾患 (mood disorders) 的神經化學研究發現，以下何者為非？

- 憂鬱症患者腦中血清素 (serotonin) 濃度常較正常人低。
- 憂鬱症患者腦中正腎上腺素 (norepinephrine) 濃度常較正常人高。
- 選擇性血清素代謝抑制劑 (selective serotonin reuptake inhibitors) 在神經化學的角度較早期發展之藥物 (如三環藥物, tricyclic drugs) 特定性較高。
- 鋰鹽 (lithium) 常被發現對於躁狂發作的控制有效。

25. 關於情感性疾患的治療，以下何者為非？

- 心理治療效果通常優於藥物治療。
- 人際治療 (interpersonal therapy) 引導患者聚焦造成問題的人際行為。
- 認知行為治療 (cognitive behavior therapy) 聚焦患者扭曲的認知與建立正向經驗。
- 心理動力治療 (psychodynamic therapy) 強調引導患者針對內在壓抑衝突的頓悟 (insight)。